

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr. 599 / data 19.04 .2023.

Tel.0253249043

dfggorj@yahoo.com

tel .0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 11. din 19. 04. 2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC,CAIS, CIRES ,VISIN)

Boli : monilioza produsa de ag.patogen (–Monilinia spp),ciuruirea produsa de agentul patogen – (Coryneum b),patarea rosie produsa de agentul patogen(–Polystigma rubrum),basicarea frunzelor de piersic produsa de agentul patogen(–Taphrina deformans)

Daunatori : viespea prunelor (Hoplocampa spp.),omizi defoliatoare-cotarul brun(Operopthera brumata) cotarul verde (Erannis defoliaria)

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea **tratamentului I** la Hoplocampa spp.dupa **criteriul biologi in perioada preovipozitara (depunerea primelor oua la baza caliciului floral)** numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

-boli infectie secundara si prezenta daunatorilor

Se recomanda folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- **DIFCOR 250 EC+0,5 l/ha + FASTER 10 CE =0,025 (0,250 l/ha in 1000 l apa sau**

-SIGNUM (SYREX STAR) =0,05 % + DECIS 25 WG= 0,003% sau

FOLPAN 80 WDG(FLOVINE) + MAVRIK 2F =0,05%(0,5 l/ha in 1000 l apa) sau

-SCORE 250 EC = 0,2L-0,3 L/ha + DELTAGRI(FASTER DELTA) =0, 25-0,3 l/ha sau

-KANTAREL = 0,3-0,4 l/ha + KARATE ZEON =0.15%

Perioada optima de tratament: dupa criteriul fenologic atunci cand 15 % din petale s-au scuturat ia tratamentul al II lea la 8-10 zile de la primul tratament. Avand in vedere faptul ca pana la completa dezvoltare larva migreaza in 2-3 fructe si de aceea e necesar tratamentul al II lea.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune simila pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litrisi aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploii.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea

acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor. respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritat Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate i exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:
FERMIER(S.C.;I.L.;A.F.) -----
Sediul(adresa)
Ferma-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CUN PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultur a Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))
Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

