

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr. 581/OF / data 10.04.2023

Tel.0253249043

dfggorj@yahoo.com

tel .0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.10. din 10.04.2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea buruienilor ,bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la următoarele culturi de cereale păioase:

GRAU, ORZ ,ORZOAICA SI TRITICALE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: infestarea culturii cu buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene. Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele de protecția plantelor - după caz:

Erbicide;

- DICOPUR TOP 464 SL (CEREDIN FORTE 464 SL) =0,8 - 1 l/ha sau
- DICOPUR M = 1 l/ha sau
- ATLANTIS FLEX = 0,2 l/ha -0,33 l/ha (în funcție de gradul de îmburuienare și buruienile rezistente- (iarba vântului ,odos ,coada vulpii,musetel se va da doza maximă) sau
- GRANSTAR SUPER 50 SG (CAMEO MAX) = 40 g /ha când e deficit hidric se aplică adjuvant TREND în doza 250 ml /ha se aplică de la înfrățit până la apariția frunzei standard iar apa se va folosi 500 l/ha) sau
- MUSTANG(VECTOR) =0,4-0,6 l/ha sau
- HELMSTAR 75 WG (TRIMEO) =10-20 g /ha (15-20 g/ha la grau ,triticale- și 10 -15 g/ha la orz)

Dacă în cultura și-au făcut apariția bolile foliare fainare,fuzarioza,rugini și complexul de daunători (mustele cerealelor)s,paduchele verde al cerealelor atunci concomitent cu erbicidatul puteți aplica pentru infecția primară la boli foliare fungicide și insecticide pentru daunători în următoarele amestecuri:

AMISTAR (MIRADOR 250 SC)0,75-1 L/HA + KARATE ZEON =0,15 l/ha sau

NATIVO 300 SC(TWIST PLUS)=0,8-1 L/HA +CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC)=0,1 L/HA sau

KING 250 EW =0,5 L/HA + DELTAGRI =0,3 L/HA

Perioada optimă de tratament: înfrățire păioaselor până la formarea primului internod și altele până la apariția frunzei standard iar palamida să nu depășească 10 -15 cm înălțime.:Pragul Economic de Daunare mus 10% plante atacate și infecție primară la boli.

Cantitatea de apă folosită la hectar variază între 200-400 l .

***SE VA RESPECTA CU STRICTETE PERIOADA DE ERBICIDARE RECOMANDATA A PRODUSULUI FOLOSIT. Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.**

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apc

tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor. Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de betoni. Aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploii cu temperaturi pozitive peste 8 -10 grade Celsius..Clatiti de ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate i exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitari si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.;A.F; I.I)-----
Sediul(adresa)-----
Ferma-----

REGISTRULPRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTI PLANTELOR

Data efectuarii tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documer tului prin care s-a dat in consum populatie
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza folo- sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))
Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR
TATUION

OFICIUL
FITOSANITAR
CORJ

INTOCMIT
. UNGUREANU C-TINA