


NR. 168 / 10.03.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 4 din 10.03.2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la plantele de :

RAPITA

Gargarita tulpinilor de rapita adult si larve

Boli : Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*), putregaiul negru (*Phoma lingam*), alternarioza (*Alternaria brassicae*)

Daunatori: Gargarita tulpinilor de rapita (*Ceuthorynchus napi*), puricele cruciferelor (*Psylliodes chrysocephala*) și gargarita tulpinilor de varza (*Ceuthorinchus pallidactylus*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai atunci când pragul economic de daunare (PED)- frecvența plantelor atacate de gargarita tulpinilor este de 3-10 % iar pentru purici este de 10-25 % plante atacate). Când folosim capcane galbene pentru monitorizarea daunătorilor: gargarita tulpinilor de rapita și gargarita tulpinilor de varza vom verifica 3 zile la rând și dacă pe capcana sunt prinși 10 indivizi atunci va începe imperecherea și depunerea pontei. Se trebuie aplicată măsura de combatere. Gargarita hibernează în sol ca adult și începe migrarea în condiții neastepțate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6 grade C. Perioada de activitate începe în ferestrele iernii la temperaturi cu valori mai mari de 6 grade C. Adultii depun panta pe tulpina către varf, larvele rod galerii în maduva tulpinilor și se încetinește creșterea plantelor, ele ramifică bogat, sunt sensibile la cadere, formează silicve seci și cu semințe de slabă calitate.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-prezența daunătorilor și infecție primară la boli

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

*EVALIA (TAZER a doua denumire)=1 L/ha +CYPERGUARD MAX=0,05 L/HA sau

*FOLICUR SOLO 250 EW /VALOR 250EW =1 l/ha +DELMETROS 100 SC(KORON 100EC)=0,05 L/HA sau

* MATIZ /ERASMUS a doua denumire comercială =1 litru/ha + DELCAPS 050CS/(DELTOP 050 CS a doua denumire)=0,08-0,1 l/ sau

* ZIZAN 500 SC(AMBROSSIO 500SC a doua denumire com.) =0,5 L/ha + DECIS EXPERT 100EC=75 ML/HA

Cantitatea de apa folosita la ha este 300-500 l.

Perioada optima de tratament : prezenta daunatorilor in culturi iar tratamentul II se va repeta daca atacul persista .

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)la folosirea produselor de protectia plantelor.Atentie la PRIMARII -afisati buletinele de avertizare la loc vizibil pentru fermierii dumneavoastra

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara. Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. „Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgentia Nationala Fitosanitară si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de produse de protectia plantelor(erbicide,fungicide,insecticide,acaricide)atat persoane fizice sau juridice trebuie sa deţină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.I.,A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament . Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. şi Data Documentului prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Den u- mire a Ppp folosit	Doza Omologat a /doz a folo- sita	Su- pra - fat a (ha)	Cantit . Utili- zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini conţine registrul, purtand semnătura (si stampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii .

COORDONATOR
Croitoru Dorin Catalin



Intocmit
Ungureanu C-tina